

毎日のつらい痛みに

サロパス[®] EX インドメタシン 3.5%

〈微香性〉鎮痛消炎プラスター

商品の特長

- インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。
- 肩こりの関係部位（肩、首の付け根、肩甲骨周辺）などに貼りやすいコンパクトサイズ。
- 微香性なので使っていることが気にならない。

⚠️【使用上の注意】**❌ してはいけないこと** 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 11歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、ねんざ**【用法・用量】** 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
インドメタシン	3.5g
ℓ-メントール	3.5g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

《包 装》5.4cm × 8.56cm …………… 20枚入、40枚入、60枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00—17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)